文件编号：G-17402Q-1

试管预制培养基

胰酪大豆胨液体培养基（TSB）

【中文名称】胰酪大豆胨液体培养基（TSB）
【英文名称】Tryptic (Trypticase) Soy Broth
【产 品 号】

货号	产品规格	产品类型及包装容器规格
17402Q	7.5mL/支×40支/盒	采血管

【用　　途】用于真菌和需氧菌的培养及其他用途。
【原　　理】

胰酪胨，又称胰蛋白胨，由胰蛋白酶消化酪蛋白所得，其氨基酸比较齐全，特别是色氨酸的含量比较高。大豆木瓜蛋白酶水解物，木瓜蛋白酶消化大豆粉所得水解物，含有丰富的碳水化合物和维生素，尤其是维生素 B1 含量较高，适用包括真菌在内的极广泛的细菌生长。氯化钠调节渗透压。磷酸氢二钾作为缓冲剂。无水葡萄糖提供碳源。

【成　　分】

胰酪胨	17.0g	磷酸氢二钾	2.5g
大豆木瓜蛋白酶水解物	3.0g	无水葡萄糖	2.3g
氯化钠	5.0g	纯化水	1000mL

参照《中国药典》2025 版配方配制。

【灭菌条件】121℃ 高压灭菌 15min。
【使用方法】

在洁净环境，打开包装，用 75%酒精对试管盖表面消毒，开盖后即可使用，需注意无菌操作。

【质量控制】

1. 外观(性状)：均一黄色澄明液体
2. pH 值（25℃）：7.3±0.2
3. 无菌性：30-35℃培养 7 天，无菌落生长。

4. 微生物检测:

质控指标	菌株	接种量	计数培养基	对照培养基	培养条件	评定标准
灵敏度	枯草芽孢杆菌 CMCC(B) 63501	10~100cfu	TSA	TSB-RM	30～35℃ 培养 24~48h 和 20～25℃ 培养 48~72h	生长良好
	白色念珠菌 CMCC(F) 98001	10~100cfu	SDA			
	黑曲霉 CMCC(F) 98003	10~100cfu				

【有 效 期】12 个月

【保存条件】2～25℃

【注意事项】

1. 本品使用时请做好适当的防护措施。
2. 包装不可二次使用。
3. 按照适当的生物危害处理方式处理废弃的产品，检测之后带菌容器置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后，可丢弃处理。
4. 本产品仅适用于工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。

【执行标准】中国药典2025版、USP、EP、JP

【资料下载信息】质检报告可登录北京三药网站https://www.nifdc.com， 打开“报告查询”页面，输入货号和批号下载。

【参考文献】

1. 《中华人民共和国药典》2025 年版
2. USP-NF

【说明书核准日期及修订日期】2026 年 09 月 17 日